## 庫全書

子部

詳校官太衛院衛官上姜晟

編修臣倉聖脈覆勘 校對官中書臣王鍾泰 總校官庶吉士臣倉聖林 **腾绿監生臣崔鹤立** 

欽定四庫全書 普濟方卷一百三十九

次足刀事公生了 一 謂之畜血此由太陽隨經察熱在裏血為熟所搏結而 不行畜於下焦之所致經曰太陽病七八日表症仍在 者是也血乾於上而吐血者謂之薄厥留於下而疾者 傷寒畜血者如血在下焦結聚而不行畜積而不散 普滴方 明 周王朱橚 撰

滿 寒有熟小腹滿應小便不利令及利者為有血也太陽 看傷寒必先觀兩目次看口古然後自心下至小腹 脉 病身黄脉沈結小 小便若小便自利者則是畜血之症可下瘀血經曰 满小便自利者下血乃愈抵當湯主之者是也大 便當問其小便若小便不利者則是津液留結可利 ,攝按之覺有滿鞭者則當審而治之如小 做而沈及不結胃其人如狂者以熟在下焦小 腹 腹鞭小便不利者為無血也小便 腹覺有鞭 傷 當 抵 自

卷一百

r

大元の野社社 也血瘀於下所以喜忘者內經曰血并於下亂而喜忘 者是也二者若有其一則為畜血症明矣畜血之症又 畜血於下所以如狂者經謂熟結膀胱其人如狂者是 其人喜忘屎雖硬大便及易其色必黑亦是畜血之症 桃仁承氣湯以利之醫妙者何也在乎識形症明脉息 以下之如外已解但小腹急結者則為畜血之輕也須 利其人如狂者血症諦也皆須抵當湯九下之陽明病 有輕重馬如狂者喜忘也皆畜血之甚者須抵當湯丸 普濟方

晓虚實知傳變其於形症之明者衆人所共識又何以 金がじたりって 時與承氣湯下者多矣獨能處以抵當湯下之者是為 醫之妙者也若是者何以知其有畜血也其脉浮而數 以為妙且如病人無表裏症發熟七八日雖脉浮數者 見其妙必也形症之參差東人所未識獨先識之乃所 之際又無喜忘如狂之症亦無小腹鞭滿之候當是之 日不大便者此有瘀血抵當湯主之當不大便六七日 可下之假令已下脉數不解合熟則消穀善饑至六七 卷一百 ħ

者浮則傷氣數則傷血熱客於氣則脉浮熱客於血則 **設定四車全書** 浮者則榮血問熟去而衛氣間熱在矣為邪氣獨留心 脉数因下之後浮數俱去則已若下之後數去其脉但 血得以去 泄必便 膿血也若不大便六七 日則血不 則飢邪熱不殺穀潮熱發渴也及下之後浮脉去而數 出泄必畜在下焦為瘀血是須抵當湯下之 **血乃下行胃虚協熱消穀善飢血至下焦若下不止** 不解者則衛氣間熱去而紫血間熱在矣熟則氣合覆 普濟方 Ξ 傷官 則

; ۲

熱入血室小柴胡湯力所不及者於內加五靈脂仍以 黄連赤茯苓湯佐之盖心主血黃連茯苓皆清心凉血 **留畜惡血內外俱熟昏愦譫語亦有耳聲虛鳴之症與** 有餘男矣 之劑所以收功若夫疎利血毒則活人書桃仁永氣湯 /陽經受病相似如服小柴胡湯不效當以黃連一 茯苓半分剉細入燈心煎與之男女通月几大小産

及定四軍全書 图 積畜血喜忘如狂 **東湯出聖濟** 右剉如麻豆大每服五錢用水二盞煎至一 温服 黄 五錢芍藥 總鍊 · 北聖 治傷寒內有瘀血大便不利小便急痛 商治傷寒太陽病隨經入惠 湯浸去皮火雙仁水蛭 牡丹皮 黄 617 半 犀角 鳑生用 一兩生乾 米炒黄 灼 一盛去

犀角地黄湯 右吹咀水九升煮三升分三服有熟如狂者加黄苓 瘀血及鼻衄血也吐血不盡餘血停留致面黃大便 右除桃仁外簏据篩入桃仁同研令匀每服二錢以 犀角 通 ) 半两 蓋煎至七分去滓温服不計時候 的生地黄 的 禁事壮丹皮 治傷寒及瘟病應發汗而不汗內畜為 百三十七 あ

**芍樂地黄湯** 右以水六升煮取三升去滓温服一升日三時行本 鼻衂面黄大便黑者 芍樂 生地黄 黄芩 有畜血者腹脇滿如搖 瘡疹大戍 治不同何以升麻代之以是知引入陽明也魚治 大黃腹不滿為無熟不可加升麻與犀角性味主 治傷寒發熱疹出血并有積喜忘如狂 牡丹皮 各五 鏌

次定四事全書

普游方

£

脉至舌熱氣留於血血氣壅故令舌腫脹診其脉數急 手少陰心之經其氣通於舌凡此經絡為風熟所東隋 少陰之脉循喉嚨夾舌本厥陰之脉循喉嚨之後 則 舌 傷寒舌腫脹者病在三陰也太陰之脉連舌本散舌 岩 傷寒舌腫脹 古 方 んご 傷寒舌 胂 舌 主於 有 血 腫 旮 逈 虚為 是 热 毒 执 所東又 傷 於 脾 也心 佳

 快定四車全書 **支參散為方治傷寒上焦虛毒氣熱壅塞咽喉連舌腫** 痛 右為麁散每服四錢水一中盈入黑豆三十粒煎至 玄參 五分去滓不計時候温服 川大黄蜘蜂黄連去精各 甘草生用 治傷寒心脾熱舌腫 射干 半两 普濟方 黄芩 川升麻 六 黄縣

治傷寒心脾虚熱舌腫方 治傷寒咽喉閉塞舌根腫痛方用 右為簏散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計 右為魇散每服五錢水二大盞煎至五分去滓不計 時候温服 蒼耳根西半甘草 時候温服 生剉 出 聖 出壁

一鈆霜散 钦定四年全書 傷寒心脾熱口瘡舌腫咽喉疼痛宜服此方 右為簏散每服二錢水一中盞煎至五分去滓不 右為細末每服不計時候煎竹葉熟水調下 時候温服 **欽霜州牛黃** 羚羊角屑 治傷寒心脾壅熱舌腫多吐痰逆 黄葉 大 判 一分麥門冬 運安矣 普濟方 甘草川大黄 两去 白菊花 出 錢 聖

龍膽散 升麻散 右為細末不計時候磨犀角温水調下二錢 右為細末入牛黄鉱霜同研令勻不計時候以淡竹 龍膽 瀝二合調下二錢如無竹瀝犀角温水調下亦得 微木 甘草 治傷寒喉中痛舌根腫滿不能轉動此謂 去蘆 治傷寒心脾熱多乾舌腫口內生瘡 雨 剉 麥門冬士心 生例 黄連三分 去り đ 知母 大大大大大 朌

改記四事公告 一升麻湯 痛不下食 此樂 右為產散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓 **脾熟毒宜先用針當舌中針入五分出血即消後服** 乾地黄 川升麻 計時候温服 治傷寒熱病咽喉壅塞連舌根痛及乾嘔頭 川朴硝 車前子 普濟方 甘草 生 用

乾地黄湯 唾不下食 右簏搖篩每服五錢用水一盞煎至八分去滓食後 青竹好 生乳地黄 温服日再 治傷寒心脾虚熟喉中有瘡連舌根腫涕 各半支参 去心焙条 焙二 啊 青竹茹 前胡去薩頭 各三分十行 鷄蘇 大通 黄葉 去黑 皮

滿疼痛 右魔狼節每服五錢水一 杏仁に炒黄る 一 魔 提 師 母 服 三 錢 水 一 盞 煎 至 と 分 去 滓 食後 温 服 犀角衛當歸的白芷 温服日再 楊浸去 皮尖雙 治傷寒脾肺虚熱毒氣壅塞咽喉連舌根腫 Á9 , 盞半煎至八分去滓食後 甘草或射干

一多定四年全書 木通湯 馬閥根湯 聚於心胃 一產提節母服三錢水 馬嗣根 服日再 木通對各艺祭 木通<sup>当</sup>絡石<sup>碎</sup>朴 治傷寒熟病喉咽閉塞連舌根腫痛熱毒氣 治傷寒喉咽閉塞連舌腫疼小便赤澀 升麻谷 雨 卷一百三十九 程参 盛煎至七分去洋食後温 升麻 射干 犀角唇 犀角屑 山梔

次定四事全書 右簏搖每服三錢水一大盞煎至又分去滓食後温 右搖羅為散每服三錢水一大盞煎至半盞許去滓 玄參 服 食後温服日再服 各三 一焦虚熱毒熱壅塞喉咽連舌腫痛方 射干 當歸切時各 射干并桔梗以芍藥

治傷寒心脾有熱舌本腫痛力見本門前 治傷寒舌腫口内生瘡此是心脾積熱上街所致湯 治傷寒舌出寸長連日不收名應手方 右用梅花片脳為末橡舌上隨手而收用五錢重 石簏搖節每服三錢水一大盞煎至半盞去滓食後 温服 大青 傷寒咳嗽 升麻 大黄山炒各 卷一百三十 生瘡類地黄煎 黄連去 一分 17 古

表半裏而咳者雖同曰咳而治各不同也内經曰肺之 咳之由來有肺寒而咳者有停飲而咳者有邪氣在半 連連不止坐卧不安語言不竟動引百骸聲聞四近矣 形寒飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈 合其寒飲食入胃從肺脉上至於肺肺寒則内合外 令唯中淫淫如痒習習如梗是令咳也甚者續續不已 夫傷寒咳者盖效謦欬之欬俗謂之嗽者是也肺主氣 令人咳何也皮毛者肺之客也皮毛先受寒氣以從共 咽

次記の事を言

皆濟方

默默不欲飲食心煩喜嘔或咳者小柴胡汤去人參大 飲與表寒相合而咳者真武湯所主為水飲與裏寒相 飲而咳者也雖皆為水飲所作而小青龍湯所主為水 合而致者又不可不知也傷寒中風往來寒熟貿脇苦滿 痛小便不利四肢沈重疼痛自下利者此為有水氣其 心下有水氣乾嘔發熱而咳小青龍湯主之少陰病腹 人或教者真武湯加五味子細辛乾薑主之二者是停 因而客之則為咳嗽者是肺寒而咳也傷寒表而不 百 解

次定四事全誓! 裏動肺而咳者四逆散所主為陰邪傅裏動肺而咳者又 東生薑加乾薑五味子主之少陰病四逆其人或咳者 又有不可發汗者經曰咳而小便利者不可發汗發 以臟真高於肺故也咳為肺疾治之必發設而可矣而 寒飲則傷肺故也陽邪也陰邪也自表傳裏則必動肺 不可不知也表寒也裏寒也協水飲則必動肺以形寒 **教者雖皆為氣傳裏而小柴胡湯所主為陽邪傳** 四逆散加乾薑五味子主之二者是邪氣自表傳衷而 曹海方 +

陽之表水也十聚湯太陽之裏水也真武湯陰症之水 陽致法因自條其間水嗽三症不可無辯小青龍湯太 東之又與氣搏熟寒水飲皆生痰壅嗽之所從始乎陰 若是少陰類下利四肢沈重更青凉肺主氣氣逆而 之側可察之歌曰嗽家嘔喘属膀胱寒熱毒堅值少陽 下則嗽熱邪東之氣則燥欝寒邪東之氣則冷滯水飲 則四肢厥逆义曰咳而發汗踡而苦淌腹中復堅茲 也又脉散者為心火形於肺金鬼賊相刑必死臨病 難

寒身體痛者只依本方若身凉咳嗽乾嘔假利心下痞 鞍滿而痛嗽小柴胡湯或利去人參生薑來加五味子 满引肠疼痛為裏有水十棗湯少陽病寒熱往來胸脇 **嗽則真武湯温之裏癖合水動肺為嗽馬十棗所以下** 氣也常須知之雖然古人一 裏小青龍小便不利小腹滿者去麻黄加茯苓發熱惡 之也太陽病身熱嗽喘心下怔忡乾嘔微利此水魚在 水與表寒也今而吸則小青龍汗之水與表寒相合而 樂對一病所主安在哉日

次定四事全事 一

普濟方

亦有熱而作痛者頹下之大柴胡湯張氏曰發汗不解 痛或泄利或悸四逆散加五味子乾薑少陰咳而嘔渴 大柴胡下之咳嗽中滿而嘔用大半夏湯解利以後胃 腹滿痛者急下之可大承氣湯又曰腹中滿痛此為實 或嘔真武湯加五味子乾薑細辛少陰咳而四逆或腹 **乾薑少陰病水氣咳嗽四肢痛重腹痛小便不利下利** 胡加黄苓生薑煎湯咳嗽頭痛不惡寒身大熱若臍腹 心煩不得眠下利猪苓湯熟嗽金沸草散或睡濃無蒜 一百三十

射干散 嘔發熱而嗽小青龍湯小便不利小腹滿者青龍湯 次定四軍主 寒不食則理中湯加橘皮半夏茯苓細辛五味子痰多 麻黄加茯苓也 日咳而嘔渴心煩不得服猪苓湯表未解心下有水乹 陳湯加細辛五味子治嗽通用大橘皮湯下利六七 者 治傷寒咳嗽氣促喉鳴乾嗽無唾喉中如硬 普濟方 十四

柴胡散 右簏搖篩毋服四錢水一中盞入生薑半分煎至 柴胡 射干 去猴各 分去滓不計時候温服 治傷寒咳嗽煩熱四肢骨節頭目疼痛 去诣 一雨 微赤 半两灸 ¥ 石膏而知母 月母 對] 湯浸去 皮尖雙 仁姓炒微黄 煨微 一百三十九 葛根町 貝母 7仁处炒微黄各 湯浸 各三 令微黄 去皮尖 百合 雙

版定四事全書 P 陳橘皮散上書治春冬傷寒秋夏冷温咳嗽喉中 石魔狼筋每服四錢水一中盛入生薑半 一氣不得下頭痛方 微黄 分 分去滓不計時候温服 味切以水七升煮取三升分三服不差重合之 麩 炒雷歸 白旗焙繁死去 桂心 普濟方 甘草 失版黄本名 大根 仁皮火 各半 支 分煎至上 湯浸 去 雙

又方旗命方 中清水出者 仁湯 橘皮 |魔狼節每服三錢水一盞煎至七分去滓温服 出楊 杏仁湯沒去及失紫乾去苗黄芩去黑苗歸切 起海藻菘菜生葱一方用薑半分同煎 捺 節 去沫桂去粗皮 治傷寒肺建咳嗽上氣喉咽氣逆或惡寒臭 湯浸去白 子建 雙仁炒 焙各半 治傷寒社熱頭及身痛胸膈不利咳 木香 卷一百三十 次主四年全等 一 右搖篩母服三錢水一盞半入生薑二片同煎♡ 歹痰宜服 敖冬花 去滓食後臨卧熱服一方有黄芩 防風去义 也な治傷寒咳嗽喘息不得 湯浸去皮头麻黄去根 雙仁处炒 分分 杏仁湯浸去皮失 生乾地黄 柴胡去紫苑去 七姓炒做 土 桔梗炒卷活 掠去沫 黄 節湯 焙 煮 貝母士射了 百部 頭半 去蘆

金グログノニ 旋復花散 右搖篩為散每服四錢水一 養搖節每服四錢水一中盛入生薑半分前六分 地黄 旋復花 六分去滓不計時候温服 云滓不計時候温服 出聖 恵 5、治傷寒咳嗽涕出吐腥氣心胸壅悶 甘並 百部 桑根白皮 美假赤剉 各三 甘草 卷一百三十 一對於記日 分 各半两 炙做赤 中盛入生薑半分煎至 'n 1去苗 剉 生乾

前胡散 欠こりまたいきう 右簏搖篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎六分 前胡頭 麻黄去根也 百部 桃仁 去滓不計時候温服 恵方治傷寒放嗽頭目痛痰滞胸膈不利 雙仁炒做黃人桂皮 無平兩湯浸去皮尖入桂去敬田平各 恵が治傷寒咳嗽引心腹痛 月母比各三分 朱胡蓝颐 桔梗 替済方 皮機 湯浸去 一兩去石膏 一美微 赤剉 ¥ 支 葛根 Ξ

金分四月百月 前胡豆薑白术 候温服 去滓不計時 **羅搖篩每服四錢水一中盛入生薑半** 忠方治傷寒咳嗽嘔逆不納飲食 做赤剉 推節每服四錢水一中盞煎六分去滓 分炙 去蓝 傶 候温服 紫死 \* 卷一百三十九 去苗土 湯浸去紫蘇聖茶 兩 白粮 半夏之過去滑 )三分湯洗 甘

改定四草全書 生乾地黄散 百合散也好治傷寒咳嗽頭目連背脖浮腫喘促大 便不利 右簏搖節每服四錢水一中盞入生薑半分煎六 鹿角膠排 百合 去滓不計時候温服 生乾地黄 郁李 車前子 治傷寒咳嗽吐血 \* 炒令黄 湯浸去及大腹皮州赤茯苓 普灣炒 赤茯苓二甘草一分矣 桑根白皮山紫苑去 一分关 **十** 八 紫 苗

天門冬散 右麓搖篩每服四錢水一中盤入生薑半分煎六分 右簏搖篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎六分 去滓不計時候温服 白皮對漢防已 蘇並禁 天門冬は赤茯苓 具母照 出聖 治傷寒咳嗽連胸背痛 陳福皮湯沒去粮甜亭產 前胡玉蘆頭已 卷一百三十九 半 生乾地黄 甘草 枳殼魚炒 微赤 全紫色桑根 防紙炒 一分炙 黄去 剀 稂 緞 細

次足の事と書 治傷寒咳嗽鼻塞壅悶大腸氣滞 林黄散出聖人 右簏搖篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎六分 麻黄去根 đэ 各半 去滓不計時候温服 去滓不計時候温服 恵方治傷寒咳嗽胃膈壅悶心神煩躁 炙做 贝母 赤 À 前胡 煨 令 微 黄 川 升 麻 告濟方 頭 指苓皮 枳殼麸炒 分 鲯 葛根州知母 九 黄去

桑根白皮散 **乾頭痛大小便閉澀** 右簏搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎六分 去滓不計時候温服 胡 桑根白皮 起炒 去藏 湯 浸去皮 百合 徴 生乾地黄 一門白前 货各 治傷寒肺熱咳嗽涕唾稠黏背拘急口 火 雙 ¥ 川大黄物神积殼鬼外 卷一百三十 丙 1= 麥門冬士心名 甘草 炙微 未判 陳橘皮 粮 木通 湯 颅 泛雨去 稂 黄 去 焙 杏 前

次定四事全書 治傷寒咳嗽鼻有清涕喫食减少 右魔狼節每服四錢水 (產搖節每服四錢水一中蓋入生薑半分聚三枚 細辛 後時白木 候温服 煎六分去滓温服不計時 碎炒機 五味子 而旋復花 谷半 甘草做水 普濟方 八去蘆 肉桂! 中盜煎六分去滓不計 分矣 甘草 炙躈赤 各半两 工士級陳福皮 剉 Ē

細辛散 金りてん 石膏散 右簏搖節毋服四錢水一中盞入生薑半分豉五 細辛 石膏 粒煎六分去滓不計時候温服 仁处炒做黄 治傷寒咳嗽喘促鼻寒 治傷寒頭痛咳嗽壮熱四肢酸痛 锡浸去皮尖 前胡魚萬根外赤芍藥 桑根白皮明荆芥分 五董麻黄去根附子 頸 雙 卷一百三十九 前胡 15 川升麻 大旗百合 頸 炮製去 柴胡 ŧ 肉桂去皺 去苗 兩 各

改皇四事全書 1 右為細末毎服一錢如茶煎五七沸不計時候稍執 右簏携篩毋服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚 麻黄根節 煎六分去滓不計時候温服 甘草 桂心 前五白木 失做赤剉 治傷寒風冷入肺咳嗽不止 各半两 良節 桔梗 甘草 厚朴美汗灰全香 炎做赤 ~盖 五味子 一雨去粗皮蓬生 一炮製桔梗玉蘆 **5**·] Ī

大門冬九 右為細末煉蜜和搖一二百杵九如梧桐子大每服 服 不計時候生薑腸下二十九日三四服 各三 对右仁湯沒去皮失 奥 治傷寒氣壅咳嗽咽喉胸膈不利喘息 治傷寒心肺壅熱咳嗽口苦氣促 西上漢防己 麩 炒做 黄 积設去旗也甘草 甜等態 為 此外 桑根白 矣飲

及足四年全十二 右為細末用皂角膏和搖一二百杵九如梧桐子 麻黄源去沫焙 **毎服不計時候以清粥飲二十九** 厭 炙 令 煉 去 子 挺去黑皮逐 治傷寒咳嗽日夜不止 ,夫根節湯煮 半斤不 葛根 渴浸丢皮尖雙 仁处好做黄 桑根白皮 赤茯苓去黑皮 普灣方 以竞子小便三升浸 如方百合 我到各於苑 **炙做赤** 對

金りて 五味子飲 右粗搖篩每服三錢水一中蓋入生薑三片同前 石扑筛每服五錢水一 五味子 膠 分去滓不拘時候温服 枚擘破同煎八分去滓不計時候温服 雨 灰爆 兩 石膏 甘草州, 好麻黄去根節湯 治傷寒咳嗽 平成杏仁 雨 を一百三十 中盛入生薑半分拍碎 湯浸去皮 桂 炒各 煮 半 去粗 火 两 两 雙 皮 始各 湯浸去 台 啊 阿

次にり事人は可 紫蘇湯 加減真武湯與軍 嘔或咳 腹痛小便不利四肢沉重自下利者此為有水氣或 右粗棍篩每服三錢水一中盞煎至六分去滓温服 甘草 不計時 炙剉 治傷寒咳嗽 兩麻黃去根節湯煮 主少陰症二三日不已至四五日 去木焙 告濟方 雨 椋 1 関に炒 湯浸去皮 Ī = 尖 雨

前胡湯 右對如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑四片煎 石粗据筛母服三錢水一盞生薑三片煎六分去 前胡其蔗大腹皮 白茯苓士思芍藥 皮 炮製去 分去滓温服 膌 湯浸去 给 息及 治傷寒咳嗽痰睡胃膈不利頭目昏眩 頭 細辛 白 あ 其前乾薑一十 卷一百三十九 白术 去涓 湯浸上適 五味子以各附子 焙 甘草門

一段定四事全書一 馬党鈴湯出聖清 四进散人書主少陰病四逆其人或悸或小便不利者 其脉右手寸關洪大浮数宜服此方 或腹中痛或泄利下重 石搖羅為雙母服二錢米飲調下日三服 温服不拘時候 炮半 到积實其張胡出为樂 治傷寒熱病發嫩坐卧喘息不安 普濟方 五味子 云

無力 石麓提節每服四錢水一 馬兜鈴 1 ノノニニ 心桔梗 去滓温服徐徐喫 去苗 苓散也重治傷寒咳嗽心膈壅悶肩背煩痛 大腹皮 杏 仁妙哉 老活再柴胡去具母去皮头雙老活半柴胡去具母 黄去根節湯煮麥門冬生心紫花 卷一百三十九 掠去沫焙 一盏半生量三片同煎 去蘆頭半夏 湯 浸 沸

文をりまれたは 石簏搗節毋服四錢水一中鹽生薑半分煎六分去 去黑 石膏 甘甘 滓不拘時候温服 三分 出聖濟 檳榔 美 桑根白皮 皮 節每服五錢水一 麥 麥門久 貝母 普濟方 咳嗽肺熱頭痛 前胡 判各 半两 各半两麥門冬去心 一盏半入竹葉三七片同煎 ル三分 棟福口 焙 Ĭ 白狼焙

金グセガノニ 魔據節每服三錢水一 甘饱 沸去滓温服不拘時候 生乾地黄 出聖濟 去洋食後温服 炙 出聖 雨 剉 各 治傷寒邪热攻肺咳嗽心悶曛膿 濟 両 治傷寒毒氣攻肺咳嗽喉中生瘡 去凉 一百 <u>=</u> 内杏 盛盛 Ħ 12 小匙頭同煎三两 湯浸去 貝母 炒 心麥門 皮 あ 兯 火 甘

たのう ラーハー 右剉如麻豆每服三錢水一 ) 擅師每服五錢水一盞半生薑半分掐碎同煎 八分去滓食後温服 分去滓温服 出聖濟 外教冬花少麻黄去根節天門冬去心始 島 炮 一 又湯浸洗麻黄去和 治傷寒咳嗽頭痛 各一两附子 普濟方 盞生善半分拍碎同煎 炮製去皮夫冬花 腑半两 Ī

射干湯與 卸坑四母全書 乾噦喉中不利 右簏搖節每服五錢水一 射干 枚擘破同煎 去前王陳橋皮 出理 消治春冬傷寒秋夏中冷咳嗽喉鳴聲 半两 杏仁湯浸去皮火雙 桑根白皮 仁炒各 焙半雨 卷一百三十九 湯浸去 麻黄去根節湯煮掠去 雨 食後温服 白 生薑一 沐焰各 湯洗去 Ä]

大のりしたいか 右對如麻豆每服五錢水一中益半生薑五片煎 鈴 分去滓温服 出聖濟治肺臓感寒發嗽下 炙各 一 粗皮生姜 總錄 的五 桂生 \*桑根白皮 各两柱 去皮尖雙 雨 去粗 及 黃連去百合 持済分 月母 射干 小止無頭痛不可忍 一矣 判各族 敖冬花 地榆 Ī 赤石脂 馬兜 厚朴

潤肺湯 銀好四月百十 節旋復花 温服 湯浸去白 **搖篩每服五錢水一中盞半煎取八分去滓食後** 炸 焙 汥 两半 知母 失便仁妙甘草 湯浸去皮 治傷寒客邪在肺咳嗽聲重身體微熱 節每服三錢水一 中雨敖冬花 裉 各 あ 人明各起當 林黄去根節 一盏煎七分去浑 桑根白皮 当多陳橘皮 熱叩食後

杏仁煎 人元日日人 右簏搖篩每服三錢水一盏煎八 臨卧服 葛根 溡 桑白皮 治傷寒 治傷寒於 大水通 去根節桔梗 聲不出咳嗽頭疼 石膏研 暴欽語音不出 貝母各一两紫苑 普濟方 、分去滓温服不 湯浸去皮尖 乜 抬

金ケセルノイラー 無凡散 治傷寒胃中有痰咽中作聲咳不已者 右㕮咀煎五味水三升慢火熬取一升去滓同連生 右用石碌一兩臼中杵為散取半錢水痰多者一 雖收盛旋挑膏樂禽化一方有沙糖一两半 薑研自然汁一兩半同杏仁塞一處熬成膏用磁 用薄荷湯和服痰精久者加藜蘆一兩 蜜中杏仁另研為末 治傷寒冬春秋夏冷咳嗽曲拘不得氣息喉

欠いとりるとない 右切以水一斗煮取三升去滓温分三服如病一 啞失聲乾嗽無曛喉中如硬者方 獨活 射干 紫苑 伏於內宜生薑四兩代乾薑除茱萸用枳實 用大黄二兩初秋夏月暴雨冷及天行暴寒熱氣 日者可服此湯汗後重服勿汗也病久者初服 肉桂 Ξ 异茶黄 普灣方 兴雙仁 當歸 乾薑 地甘草 橘皮 ゴル 麻黄 雨 可

知母湯 金人人口たべい 人參石膏湯 右切以水七升煮取二升五合去滓分為三服如 知母而 貝母 炙忌羊肉海藻 **小利惛慣宜服** 石膏 九里再服忌蒜麪 治傷寒骨節頭痛眼睛疼咳嗽 杏仁 治傷寒咳嗽不己心煩及風熱頭疼 乾葛 号樂 一雨去皮 尖及雙仁 松菜湯生葱 卷一百三十九 黄芩 栀子仁

細辛散 次七の事人生 右為末毎服一錢水一 五味子 温服 茯苓 白术 細辛 治傷寒咳嗽胷膈不利四肢煩痛壮熱頭痛 知母 各半 **负去根節君根** 八梔子 桔梗頭 普消方 甘草 中益生薑三片煎六分去滓 五 桂心谷 炙 雨 紫苑 石膏 7洗去土苗荆芥 雨 雨 Ξ 付行 Ŧ 白木 炎微

桔梗甘草湯 争りでし 右麓搖節母服五錢用水一 右羅語節每服五錢水 煎 桔梗 **六分去滓不拘時候温服** 大腹皮型枳殼 、分去滓食前温服 人以甘草 治傷寒素有喘息嗽發動不得即胸滿短氣 治傷寒咳嗽胃膈壅悶心神煩躁 去旗 麩炒 我一百三十九 湯洗去ち樂 大盛生薑半 盛半 半两 去皮各 生薑半分拍碎 前胡 旋復花 去蘆 兩 庐 顄

**丸足の事をとす** 前 右魔狼篩以來十枚煮取肉九如梧桐子大各於九 者本末九主之以病本在腎末在肺故也 胡飲 不得常多嘔逆 雄黄 急投麻油中取出冷藍汁 上針 錢亦治產最良 治肺臌感寒痰嗽不止心膈煩滿飲 乳日乾取二九服以針穿定藥燈上燒紅 硃砂 鉛丹 普濟方 風化灰 下便即禁熱物喘甚如 各三石比

夫陰陽不順清濁二氣相干臟腑不調真邪交錯腸胃 變亂故令吐潟也若夫傷寒脾氣既虚心膈煩熬腹脹 金グロアスニー 右搖篩每服五錢水一盞半生薑一分切同煎取 前胡玉董 皮 分去滓食後頓服 傷寒霍亂論 生乾地黄治甘草 焙二兩 湯浸去 滑 頭 桔梗 妙旋復花炒玄參 卷一百三十九 炙州各 雨 厚村头 ト去粗 皮生姜 両半

次足四軍人等 謂之吐利必也上吐下利躁擾煩亂乃謂之霍亂其與 攻四肢厥冷或吐或利故名霍亂也傷寒霍亂者上吐 頭痛身體惡寒宿食不消中焦壅滞祭衛氣逆冷熱相 傷使陰陽乖隔遂在上吐而下利若上嘔吐而利經上 在下焦者但利而不吐岩邪在中焦胃氣不治為邪所 利者飲食所傷也其有魚傷寒之邪内外不和者謂 但稱吐利者有以其也傷寒吐利者那氣所傷霍亂吐 下利揮霍而撩亂是也邪在上焦者但吐而不利邪 普消方 手

此属何病答曰霍亂者頭痛發熱熱多欲飲水者五苓 散主之寒多不用水者治中九主之以其中焦之失治 金グアセ 陰陽乖隔必有偏之者偏陽則多熱偏陰則多寒許仁 于胃中水穀泄盡則止矣所以死者少及其乾霍亂而 則曰病有乾霍亂者有濕霍亂者乾霍亂者死多濕霍 死多者以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出 亂者死少盖吐利所傷之物得以出泄雖霍亂甚則上 頭痛發熱而吐利也經曰發熱頭痛身疼惡寒吐利者 1.1.1.1 卷一百三十九

名霍亂皆邪氣在中焦使陰陽二氣不能升降則心腹 泄壅閉正氣隔陰陽煩攪悶亂初無所安喘脹乾霍亂 次定四車全書 **一**人 皷痛而作吐利也其候心先痛則先吐先腹痛則先利 自倍勝胃乃傷丧身之由實自致爾 而死嗚呼飲食有節起居有常者豈得致霍亂耶飲食 故其状有熟而渴有寒而渴者有發熱惡寒汗出厥逆 致撩亂故謂霍礼傷寒霍亂亦由中焦陰陽不和所致 心腹俱痛則吐利並作古人以其病迅暴揮霍之間便 普濟方 夫嘔吐而利病 ŧ

加石膏 桂枝湯熟多而渴者五苓散寒多不渴者皆用理中 急脈微欲絕者通脈四逆加猪膽湯汗後霍亂身作 者有病勢已止而身體疼痛不休者治之亦不可緊以 非霍亂也霍亂邪在中焦以飲食無節居處不常得之 憎寒厥熱薑甘附中暑焦煩腹痛侵張氏但稱吐利者 而身體痛桂枝和解最為良吐利止汗出而厥四肢拘 法歌曰四肢拘急仍無厥發熱憎寒四逆湯吐利止 又歌云霍亂湯來用五苓寒多不水理中尋

· 拘急轉筋下利者用理中湯加生附子官桂吐利汗出 散寒多而不飲水者理中湯九或有寒腹滿而痛四肢 夫飲食起居當以此為戒霍亂吐利熱多則渴者五苓 謂濕霍亂死者少乾霍亂死者多益以所傷之物或因 利所傷之物聖閉正氣間隔陰陽煩悶脇脹其死多也 偏陽則多熱偏陰則多寒卒然而走危甚風燭許仁 **夾食傷寒陰陽乖隔上吐下利而躁攪痛悶是其候爾** 利而出泄泄盡則止其少死也夫上不得吐下不得 則

一次是四事全書

普濟方

11+12

而 拘急脈微欲絕通用四逆加者膽湯霍亂通用霍香正 氣散腹痛加桂痛甚加茱萸霍香小便不利加茯苓濕 Í 金云轉筋者用理中湯加煅石膏汗後霍亂雖吐利 煩躁大温心腹撮痛四肢冷冷汗出脚轉筋香苓散千 不吐欲下不下先以鹽湯一盛頓服候吐出令透即 不吐除濕湯去蒼水如桂丁香乾霍亂心腹作痛 而身痛不少休與桂枝湯吐利已止汗出四肢厥而 熱怕寒手足厥冷拘急其脈沈細四逆湯中暑霍 长一百三十九 欲 亂

ドラ E

次主四年至十 中痞者大柴胡湯主之此別非霍亂故也 湯下大柴胡湯一症云發熱汗出不解嘔吐下利而心 其或吐寫不止面青厥冷者震靈丹研開木香乾薑煎 正氣散除濕湯為要飲食居處邪由內發治中湯主之 加官桂茯苓倍加枳殼大抵風雨寒濕邪自外入霍香 人甚急可用蘇合香九用积殼散下或用霍香正氣散 可用理中湯倍加橘紅與之凡氣痞于中不吐不寫害 方 ĮĘ 特濟方 Ī

白木散也有治傷寒霍亂胃氣不和心煩吐利不下飲 金グセ人ノニ 右握節細每服四錢水一中盈入生薑半分煎六分 食 去滓不拘時稍熱服 夫 或 枳實处炒个附子炮粮去桂心 治傷寒霍亂吐利心煩腹痛 判 黄連其赤石 已上各 半两 と一百三十七 當歸り殿半 甘

次にりまれたとう 治傷寒霍亂發熱身體疼痛多欲飲水宜服此樂方 方 恵 右搖篩為散每服四錢水一中盈入生薑半分棗三 枚煎六分去滓不拘時温服 剉 赤 去白粮焙甘草 黑皮白木分赤茯苓少桂心平甘草半两 兩厚朴美汁矣 兩 特流方 半两头 微赤剉 去粗 皮塗生 Į. 葳頭 === 雨去 出

金グロバイニ 治傷寒霍亂吐寫四肢逆冷宜服此方 四逆故也亦治傷寒霍亂吐利發熟惡寒四肢拘急手 足厥冷 右搖羅為散每服四錢水一中盛入來三枚煎六分 右搖羅為散每服四錢水一中盤煎六分去滓不 甘草 去滓不計時稍熱頑服 時候温服 赤剉 美假附子 皮脖 复葬 **桂心**一 丙炮製去 桂心已上 是一百三十 兩 恵古 务 出 就量 製 Tip 半丙 計 炮

火にとりましたい 治傷寒霍亂吐渴腹痛手足逆冷宜服此方 右㕮咀每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時 右㕮咀每服三錢水一中盞煎至五分去滓不計 厚朴美汁头 候温服 炮製 附子 候温服 白术三厚朴美汁炙食香息 去皮臍 一雨炮製 祖皮塗 日草 做赤野 / 苔消方 半两炙 生 桂心的高良薑 生 一两去 顫 出聖 Ī 恵方 фŋ

白术散也生治傷寒冷熱氣相東霍亂吐利轉筋不 金にプロアノニョー 參散也沒治傷寒霍亂吐渴不定無脾胃冷氣攻心 腹脹滿不下飲食宜服 右握筛為散每服四錢水一中益入生薑半分煎六 白术 分去滓不計時候稍熟宜服 遍 上 谷 去白狼焙 丙去 雨 去蘆 頔 甘草院亦 白茯苓 卷一百三十九 湯浸去白 酌灵 到 乾木瓜 白术 陳橘皮 ıŁ

大にりまいたす 訶梨勒九 石搖羅羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半 煎六分去滓不計時稍熱頓服 **訶梨勒**用皮 炙 皮 Ŷ 1 出兵治傷寒霍亂心腹疼痛四肢不和宜 赤野木香 半雨炙 做赤剉 'ŧ 雨 桂心 青橘皮 蘆頭 :† 一兩去 ¥ 普濟方 白ボ 傲 贫 雨 去 麩 兩厚朴美汗炎令香 很 肉荳蔻山我桂心 半两湯浸高良薑 去白根 雨去皮淫生 | 半 雨 焙 熟 服

意多湯出 右簏扑筛每服五錢水一盏半薤白三寸煎至一盏 右搖羅為末煉蜜和搖三二百杵儿如梧桐子大每 把葉找去毛 蘆根町二人参 去滓温服日三 服不計時候以生薑湯下二十九 · 治傷寒後霍亂心煩乾嘔 · 治傷寒後霍亂心膈不利 麥冬去心始 卷一百三十九 西赤茯苓,其黑皮 杝

次主四事全書 腹脹悶 参湯 石簏搖篩每服三錢水一盏生薑三片聚 香 煎至七分去滓温服日三 草荳蔻去白 出聖濟 **芍薬** 去粗皮生高良 治傷寒後霍亂吐利不止吃食不消心 白淡苓 - 去粗皮生 皮 白豆蔻去桂去粗 乾木瓜 高良薑炒 =

霍香湯出聖海 右對如麻豆每服三錢水一盞生薑三片煎至上分 右簏攙筋每服三錢水一盞煎至七分去滓温服日 霍香葉 去滓温服不拘時候 總跃 當歸切行处縣去人參 治傷寒後霍亂轉筋嘔吐不止悶絕 νħg 妙

一些意物小聖 欠正の日本を言 右簏搖篩每服三錢水一盜來一 不止心腹氣脈不思飲食 厚朴头二两 肉豆蔻仁 去滓温服日三 出聖濟 去粗皮生 去租皮生美民茱萸 治傷寒霍亂轉筋風寒客於胃府吐利 治傷寒後霍亂吐利不止及脚轉筋 · 良量 · 杜把葉我去毛 普済す )温浸焙乾 枚劈破煎至七分 桂去的机 贬

吳茱萸湯山聖濟 冷飲食不消 右簏搖篩每服三錢水一盤生薑三片鹽少許煎至 右簏搖篩毎服三錢水一盞入生薑三片煎至七分 陳福皮 哈蘇藍葉 年 七分去滓温服不拘時候 霍香葉 焙乾炒 二分湯浸 治傷寒後霍亂吐利腹脹轉筋手足 甘草美桂去粗 卷一百三十 厚朴去粗皮 丁香 生 董 雨 炒各 參 乾

又る 白木湯小里濟 次 足四軍全書 石搖篩細研為末醋煮麵糊九如梧桐子大多服三 石搗節勞服三錢入生薑三片煎至七分去滓温服 日再 白术 去滓温服日三 總録 地半門子将二两 陳橋皮湯沒去白乾木瓜 治傷寒後霍亂吐利脚轉筋 炮製去皮 普濟方 去 计炙到 租皮 兩 生姜 3 一两

齊生竹葉湯出永類 香和脾飲子 右細對分作十五服每服用水五合煎二合去滓温 内熱不解 白术 了香 服浑併煎作一 十九食前米飲送下 木香命 大腹子自草荳蔻十 野方 掘生方治一 出廣南 而甘草 部部子二節 服 治傷寒大霍亂吐寫後心虛煩悶 切傷寒霍亂吐渴 十五

とううえここう 香薷散心清治陰陽不順清濁相干氣射中焦名霍亂 錯變成吐利不已百脈昏亂榮衛俱虛 消陰陽二氣壅而不及陽氣欲降陰氣欲升陰陽亦 飲寒漿即冷席風冷之氣傷於脾胃致諸食結而不 此皆由飽食豚膾亂啖乳酪海陸百品無所不饔多 右攻咀每服四錢水一 甘草《半 麥門冬士人參 普濟方 一盏半生薑五片煎八分温服 T

多好以月白書 右為末毎服三錢水一盞酒半盞同煎至七分去滓 轉筋宜服此方 香薷 筋疼痛不可忍者頹井中沈令極冷頓服之乃 煎時不得犯鐵器慢火煎之魚治非時吐利霍亂 腹中撮痛大渴煩燥四肢逆冷冷汗出自兩脚 用新汲水頻頻浸換令頓服之藥冷則效速也仍 两半 厚朴二两 去皮黄連二兩二味入生姜 卷一百三十九 西同科炒令紫色 ľŲ

者心下滿也病發於陰者則不可下之若心腹痞滿手 大いとりは上とから 逆心下滿不痛按之不堅此為痞也法宜渴心唯表未 傷寒病發於陰而醫惧下之邪氣入裏胃中虛客氣上 解者未可攻之當先解表然後攻痞若表解而裏未和 按之自軟但氣痞爾不可復下也若熟毒氣東心則心 夫傷寒太陽少陰弁病脈浮而下之及入裏則作痞痞 下痞滿面赤目黃狂言恍惚者此為內實宜吐下之也 傷寒心腹痞滿論 特濟方 T

**贈者**難 有 不應結 身 冷 胸 心而痞 并唱無陽則 自與店 鹭 ip 故 灰 惕 也治 蓮 者久 段味 下 不 剧 遪 湯盖 解 痛 寫 属 成 む木 者心 則成疾若表裏俱虚之 吐 獨復 為湯 而 頒 妙理 痞 妶 魚 線中 枳 沈 秸 慣 夏 此 加 衝 火 梗参 胡潟 理名 燥湯皆隨 鍼 中店 积黄 不 周 咽 陮 因 最傷 而 行湯 與此 問 不能息者 良寒 者 致 熟方 と 症 大 仲本 煩面 半平 下也 下 有 夏和 景 腸審 無 滿 青 氣 痞 先知 渴宜 治 非 而 꺔 心常 用是 因 痞 不 胶

シロ

たと言い

ð

黄解結陷|利中|盖湯|上盐|中鳴|而不寒 苓麦胸胸其焦性主逆甚雷下胃 湯表與九小則董之|故甘鳴利中 い 外解据下便利锅利使草心者不 沿者 乃皆之五盖心不敗洞下生和 U m 可應不答甚甘止他心痞羞心熱 攻不可以耳草者下湯|殺沼|下 居然用主服寓 當利 主而心痞小心 沸 下解表陷之赤心治而之消肠鞭便渴則 表末胃凡石皆其心盖此主能不主 解湯店脂治下以以之噫 桂者盖服禹中焦店此曆下|食者|病三 非枝不入渴餘止未生非下利臭五人 湯可猛心粮此石薑結之已骨茶心以 也攻攻只湯湯利脂瀉熱也數下散下縣 店也用不利在 禹心 以H 十有 主店 |之宜||中陷||愈復||下餘||湯胃||復次||水之||與 黑肢大学 胃然不具根日中下穀底汗渴 結黃云九後止苦湯草庫之不腹出心 黃當大可者尽主渴客其化中表湯復 連先抵與當治之心氣痞腹雷解店

解代氣者非胡鴨熱治鞭若 旋大 湯短報心 ド 湯者 復常 治魚汗下 傷者出癌 痞 代 不症 鞭 服档 寒乃 發此 解 不 症 旋四 湯 發可 可 者除 復港湯 宜 圭 執行 10 有儿 桂而 詳 代 之岩 汗十 時雅枝数 湍 主之 來 楢 有祭 出奏頭用 謂正當心下 之 湯胃 旋汗不湯疼煩 是寒 復吐解表心 بط 是 代下心未下 者 表 稍後中解病症之熟 服湯心 鞭罷 鞭基 淌 症下 東利 乹 滿硬者 之痞 喝不 引恶 湯反 人鞭吐可 胸寒 大不 **吹其|怒而|用** 下身 柴止 胃店 是 服或氣下也下凉 胡心 旋喷不利天疼其 湯下 復 送除者 朱乾人皆店

欠正の事とは 自表傅裏至於心下留結為實者則不可下乃吐之可 也至如陽明病雖心下報滿又未可攻經曰陽明病心 煩亂饞不能食病在胷中當吐之又曰脈浮而大心下 二者為不經汗下而心下滿者或吐之看其邪氣之鳥 及硬有熱属臟者攻之下冷發汗属腑者不令攻之兹 下鞭满不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈是氯 下髙者則因而越之下者則因而竭之大要在泄其邪 之别經曰病人手足厥冷脈乍緊邪結在智中心滿而 普湾す 五

實脈沈而緊心下痛按之石鞭者大陷貿湯主之明其 留結則為鞭痛虚邪留滞則但満而不鞭痛也結胃 ·症具而以他藥下之柴胡症仍在者復與柴胡汤此 結胷虛者滿而不痛為虛結經曰嘔而發熱者柴胡 應下而強下之邪氣乗虛結於心下實者鞭滿而痛為 金少四月 而鞭痛者此為結質但滿而不痛者此為虛痞盖實那 也若未全為實者則不可下故當戒也又邪氣在表未 下之不為逆必蒸而振却復發熱汗出而解若下心滿 1.1.1.1 卷一百 三十九 雖 轨

諸寫心湯散可也二者俱是心下滿鞭一為虚一為實 益甚此非結熟但以胃中空虚容氣上逆故使鞭也須 心下痞鞭而滿醫見下心痞為病不盡而復下之其病 則為結骨須陷胃湯九攻之可也傷寒中風醫及下之 罷醫反下之胃中空虛容動於膈陽氣內陷心中因鞭 之熱入因作結貿病發於陰而發下之因作痞表邪未 之自濡但氣痞耳明其邪虚可知矣病發於陽而反 邪實可知矣脈浮而緊而反下之紫及入裏則作落按

次定四車全書

普濟方

形症悉具而加之煩躁者又為不治之疾藥之所以能 表羽未全結實下之重虚其裏邪深結則死設其結胃 **曾湯九下之或脈浮大者則不可下下之則死即是猶帶** 寒一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五日在腹 為效也又云傷寒腹滿者俗謂之肚脹是也華陀曰傷 邪邪氣勝胃氣絕者湯樂縱下胃氣不能施布雖神丹奚 勝邪者必待胃氣施布藥力始能温汗吐下之以逐其 凡投湯者大須詳審結胃雖為實邪衆皆共知當用陷

卷一有三十

n

醫及下之因而腹滿時痛者属太陽也桂枝芍樂湯主 矣如經曰其熟不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者 有燥屎自可除下之雖四五日不能為禍謂之邪氣已 滿猶生寒熱則病不除是其未全入腑若大滿大實堅 為裏症故亦有淺深之別經曰表已解而內不消非大 六日入胃謂入腑也是在腑也猶未全入裏者雖腹湯 可與小承氣湯發汗不解腹滿痛者急下之本太陽病 入腑也傷寒邪入腑是裏症已深故腹滿乃可下之多

次定四事全書

普濟方

四七

**匱界曰腹滿時減復如故此虛寒從下上也當以温藥** 實也當去之然腹滿不减者則為實也若腹滿時减者 者急下之指如此者皆裏症也雖曰腹中滿痛者此為 **那者則腹滿而吐食不下自利益甚時腹痛自太陰者** <u> 我腹属太陰症也陽熱為邪者則腹滿而咽乾陰寒為</u> 和之盖虚留滞亦為之脹但此之實者不至坚痛也大 又為虚也則不可下經曰腹滿不減減不足言當下之金

之大實痛者桂枝如大黄湯主之少陰病腹脹不大便

卷一百

金りてん

欠にりらんはう 陽則胃氣虛而不能敷布諸氣壅滞而為脹滿是當温 温之邪氣在表因發散則邪去胃為津液之主發汗亡 有當下者有當吐者何邪氣不一也但發汗後腹滿當 腹脹滿即起不安者梔子厚朴湯主之三日有當温者 傷寒後吐腹脹滿者調胃承氣湯主之傷寒下後心煩 經曰發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參主之 而腹成滿者皆邪氣東虛內容為之而所生又各不同 特齊方

脾土也治中失故專主腹滿之候又發汗吐下之後因

當吐之可也凡為醫者要職邪氣所起所在審其所起 鬱於胃中而為虚煩氣上下不得通利者腹為之滿故 吐者邪氣在表未傳入腑而妄下之耶自表東虛而入 入胃擁而為實故主脹滿當須下之可也下後腹滿可 去安岩吐後邪氣不去加之腹脹者是胃中之邪下傳 散可也吐後腹滿可下之邪氣在腎者則可吐之則邪 知邪氣之由來觀其所在知邪氣之虛實發汗吐下之 不差温補針又之適當則十全之功自可得也與論曰

金万世月石雪世

之而温常腹陽腹陽景莫是泰素後令 いりをという 入藥 淌脹 合脹 症太 蹉如 痼有 病人 起或和 多病满下肠跖阿滞冷不心 13 心唇後症腹尸心癖除腹腹 太頑調心發脹為腹因 而陰麻胃煩汗者陰脹病 或 滿 温吐可盖入承腹後何陽滿緊 脾 和氣 脹 腹 也 氣 首热热湍 所設汗下 吐湯滿脹陰不 此服心然 時為 卧满 陽和 為冷腹臟 可溥俊 汗 下又起者不苦 虚 知吐因 時史 有 不 條成減上之歌不原和是也及 誷 者所後日安朴也曾活飲而 例腹 祁 裏以腎陽者半桔經 又滿 虚主症滿施夏梗汗歌過者有 同此不腹便脾子甘 半吐括度此冷 可|展 里|家原|草 夏下 云水為執 則 審那下之承及私人 湯依問結實若 其風當後氣胃 湯冬最方君心 以腹加家吐湯良調腹下 氣虛和中如三後太仲治服痛其已故

湯日表以諸少吐合腹加大者陽有自 |腹腹||邪小||氣與|後痞|滿茯|便桂||因瘳|利 |皮脹||東涿||壅調||腹||時苓||吉枝||而太||一 痛滿虛氣滯胃滿滿喘又語加腹陰熱邪 |者不|而湯地次|脹身潮腹|太天滿 |脾大|入微厚氣|不重|热大|迫黄|时滿寒 吐又 不便當下小湯減難亦滿者湯牖 勝承於之生 汗者以用不亦陽為 水氣胃妄懂後胃轉小天有明太不可 |敌湯|中下||平腹||中側||水便||此發|陽可|以 水色电後夏 脹之語魚小症熟為下無陰 與下掩腹人滿邪言湯承並腹太积別寒 取之子服象者下口经氣小滿陰實引 湯紫 微俱 理岩 邪 搏腹厚滿日 胃傳中黃 |於脹||朴心|草氣||入不|症後||胡喘||病中||夫心 |皮迷||湯煩||湯虚|胃七|有下||湯口|桂丸|腹腹 用少而老而擁少本之職苦枝主滿滿 膚 之桔陰卧滿不局與條陽而咽大之而而 開梗病起而能為白 明小乾黄族调吐 |観 半|六不偏 数|實 虎|三 脈|便 或|湯 下|雉 食 夏之安則布也湯陽建難不厘太以而

欠にしいるといます 前胡散出聖治傷寒心腹痞滿頭痛四肢煩疼 腸 也見無短而腹脹滿用藥 右羅搖為散每服四錢水一中盈生薑半分賽三 去白术 前胡去魔頭赤茯苓 赤芍藥 剉 赤 柴胡古枳是黄去粮前烈勒是用皮甘草半两 欣 - 妈 可 术 矣 半夏茯苓湯 也腹濡 告済る 瓶 而 者 桂心 白生 戼 腹 在裹而 脹 五十 淌 沥 规 虛 庶

詞梨勒散 b 方的寒心腹痞滿咽喉噎塞四肢不和 旋復花散 金男以下有言 **背膊壅悶不欲飲食** 右羅振篩為散每服三錢水一中盈入生薑半分煎 赤茯苓 煎六分去滓不計時候温服 旋復花平半 六分去洋不計時候温服 人出聖 恵方治傷寒頭痛心腹痞滿痰壅不下飲食 陳橋皮 追去滑柱八两 前胡玉藍 ) 湯浸去白猴 卷一百三十九 烙各一两 甘草做亦則 一分灸

次足り事人時 附子寫心湯也好治傷寒腹痞滿惡寒汗出者宜服 右粗搖節為散每服三錢水一中盈入生薑半 右粗振筛為散每服三錢水一 附子皮斯 **訶梨勒**娘用 六分去滓不計時候稍熱服 川大黄州碎殿炒 木香 及降 黄連其黄芩 大腹皮 ıЂ 時頃す 判前胡五 陳橋皮 過去滑村實数於桂心百 中盛前六分去滓 川大黄州碎微 4 đ 白狼焙 **\***•**)** 

陳橋及散也好治傷寒心腹痞滿下之後心腹轉脹宜 金ケセカノニ 右粗热筛為散每服四錢水一中盈入豪三枚煎六 服 高良造西 陳橋皮 白木雨 厚朴去粗皮達生姜桂心谷三 計時候温服 分去滓稍熟不計時候服 白旗始詞梨勒皮 湯浸去 发一百三十九 赤茯苓 天薦 頭

白木散 次足の事という 右粗搖篩為散每服四錢水一中盈入生薑坐 附子 白木 熟各二雨 汁炙 全香 **寒頭項急問腹痞** 枚煎六分去沒 炮製木香 炮製去 桂心 ~:陳橘皮 告済方 稍熟不計時候服 滿氣逆不思飲食宜服 也也 **采結在心腹痞滿妨悶宜服** 當歸出 白張始厚村生生 ) 湯浸去 白旗焙白术 湯浸去 半 ţ 夫 一浩洗 遍去 皮

金グドルバニ 宜服 右粗搖節為散每服三錢水一中盛生薑半分煎工 澤鴻 殿黄各半两 夹雙仁起炒 分去滓稍熟不計時候服 る世点方治傷寒心腹痞滿两脇下急不能飲食 枳殼魚炒做 桂心 造去族白术 ま満人参 卷一百三十九 木香 大腹皮 当杏仁 去養頭甘草 浸去白粮 分矣 両 一湯浸 去皮 湯

たいりいという 治傷寒氣逆心腹痞滿不下飲食宜服此方出 右搖節為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六 1粗搖篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎 蘆頭 六分去滓稍熟不計時候服 蘆頭 桂心丹三分去桂心半 分去滓稍熟不計時候服 人祭 蓝白术 起炒黄去兜仁 三分湯浸去皮火 普濟方 积良处炒做赤茯苓和一枯 至

金人世后人 附子散出野 · 提筋為散好服三錢水一中蓋入棗三枚煎至六 提節為散母服三錢以水一中盛來三枚煎至六 分去滓稍热不計時候服 出版 治傷寒其脈沉微或因下後心腹痞滿宜服 )涉浸去 炮製去 粮焙桂心 後心腹氣痞滿煩悶宜服此方 桂心 青橘皮土白狼店 大產頭車遇判 卷一百三十九 **訶梨勒**恨用皮 各一兩涉浸 分 甘草版本 白茯苓 惠方 出聖 半雨 剹

前胡散也至治傷寒心腹痞滿不思飲食宜服 大正刀事人 利宜服 者散 まな治傷寒發汗吐下後心腹痞滿胸膈氣不 石摄筛為散每服三錢以水一中盞棗三枚入生薑 草概赤則 陳橘皮 半分煎至六分去滓不計時温服 分去滓稍熟不計時候服 各半两炙 去白焙 雨湯浸代赭研旋復花 夏之過去滑 持清方 )三分湯洗 五 去蘆 甘

治傷寒後心腹痞堅無氣促宜服此方 金タロスノニ 右搖細羅為散每服不計時候以熟酒調下 石搖篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎六 11.木香 難高子此門一類如熟為度 分去滓不計時候温服 赤 前胡西 枳是低黄去粮 白木 多点 桔梗豆 赤芍藥分三 一雨此外半夏思 豆 礼也装去毛文做 并表近去消七三日做 湯洗と甘草 速す 出 堲

欠足り事という 朱 胡湯 也 聖治傷軍 止宜服 滿表裏不解者宜服此方 口搖篩為散每服四錢以水一 製到 分炮 **小計時候温服** 甘草殿赤到 各一兩矣 普濟方 逐夾熱而利利不止心腹 白木 中益前至六分去沒 至

金グログノニー 枝去芍藥如麻黃細辛附子湯此金治氣分心下硬 附子 石搖節為散每服四錢水 八如盤邊如旋 桂枝 柴胡一雨半 枚煎六分去淖不計時候温服 各 七遍去滑 三分湯洗 去诣 枚 甘草 炒做黄黄 卷一百三十九 中盛入生薑半 雨

導引九 欠己り事と皆 枳水湯出金治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作 痛者 右以水五升煮取三升分温三服腹中 右以水七升煮麻黄去上 回新分 枳實x白木 服當汗出如蟲行及中即愈 治傷寒心下痞鞭疫 普濟方 一沫内諸樂煮取二升 與即當散也 五六 分温

金グロアノニー 氣消痞 右粗搖節每服四錢水一中盛生薑三片同煎七 追提節煉蜜和九如梧桐子大飲服三粒或五粒 甘遂 桔梗り炒半页 复湯 **「热服之一方有枳實半雨** 尚香 大戟谷二乾薑 治傷寒冷熱不和心腹痞滿時於 姜汁製陳橋皮 槟榔 卷一百三十九 焅 青皮 焙各 湯浸去白 兩

い人にいりいれたいから 半夏潟心湯 右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盛半入生薑五片 **棗三枚擘破同煎至八分去洋食後温服或傷寒** 半夏湯洗七遍黄孝去黑心乾薑如三黄連 痞鞭乹呕心烦者加甘草半两人參一兩名甘草 中風醫及下之下痢十數行穀不化腹中瀉心下 寫心湯或汗出解後胃中不和心下痞硬乾噎食 治傷寒心下痞但滿不痛者心湯 告所方 五十七 一去员

金罗以外人 甘草寫心湯 非結熟但以胃中虚容氣上逆故使鞭也 得安醫見心下痞問謂病不盡腹下之其痞益甚此 十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不 **夏九酒蒸黄連九合和每服三十五九米飲下** 如正方名生薑寫心湯一方治痰熱心胃煩疹半 臭脇下水潟不痢者加生薑一兩或乾薑半兩餘 平多四黄芩心 治傷寒中風醫及下之其人下痢日數 一起事二分半夏两米 卷一百三十九 湯洗七遍黃

次足の事とます 右㕮咀如麻豆大每服五錢用水一盏半入生薑 右細剉如麻豆大每服四錢水一盞半入大棗三枚 連去鬚一 枳實到处炒桂去粗半夏湯洗上 大腹皮 擘煎七分去滓温服日三 分拍破同煎之分去滓食後温服 两半 治傷寒後氣結不散胃中痞滿欲成結胃 對 前胡五 木通川西赤花 持済す 湯洗七遍 五 去黑皮

金グロアノニー 橘皮湯出聖濟 右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑 腹皮 遊復花る 紫蘇 里 拍碎凑二枚擘破同煎七分去滓温服 治傷寒宵中 1%浸去白 陳橘皮 治傷寒宵中痞滿心腹冷痛 afy 桂去粗皮里 卷一百三十九 **痞滿心腹氣滯不思飲食** 焙二两 - 荡浸去白 湯洗七遍 焙半雨 1.湯洗七通 去黑皮 雨半

次足り事全書 右攻咀如麻豆大每服五錢水一盞半生薑 **見湯出聖濟治傷** 处炒 1粗據篩每服五錢水一盞半入生薑一分拍碎 煎至七分去滓温服 半両 碎同煎七分去滓温服 ,出聖濟治傷寒心下痞滿小便不利 湯洗上海陳橋皮 焙令乾 普濟方 **冷痞滿嘔噦心下悸不能食** 白焙 1,等白水产一积超

金ジセト 右粗棍節每服五錢水一盞半入葱白五寸生薑 右粗搖篩每服五錢水一盈半生薑半分拍碎 茯苓去黑白芍藥 雨 剉 分拍碎同煎七分去滓食前温服 治傷寒痞滿滞氣不散似物噎塞 皮 枳實細對桂去粗人 并子各 分 瞿参穂る一 百三十 白培甘草泉木香 桑根白皮 各

设定四庫全書 茯苓前胡湯 無 治傷寒心中 右粗据筋毋服五錢水一盞半入生薑一分拍碎 台为出聖海 煎至七分去滓温服 陳橘皮 赤茯苓去黑皮 至七分去滓温服 炒全龍 人参西一 總録 白店 厚朴去租及白术 治傷寒痞滿心腹妨悶不能食 前胡三分 枳實則此木香 痞滿結氣不散 兵都二两半 六十 后

喘逆欲絶 石粗据筋毋服三錢水一盞入生薑半分拍碎同煎 石搖羅為末煉察和更搖三五百杵九如梧桐子 去黑 皮 **六分去滓温服** 出聖濟 各半两 锞 治傷寒四五日大下後心中痞滿氣息 陳橘皮 卷一百三十 爻 特各平两村重 分 地处三地

**炎定四年全書** 直勉湯 與 治傷寒發汗胃氣不和心下結 痞噫 沈香湯鬼奉治伤寒虚痞氣逆嘔吐 右粗搖篩每服二錢水半盞酒半盞葱白一 食與腸下氣滿虛鳴下利 単達浴 至半盏去滓温服 每服空心米餃下二十九晚再服加至三十九 雨 炒各 半两 普齊す 力始 涉浸去胡椒 横看子,棟實 Ŷ 握同煎

右粗搖篩毎服五錢水一盞半入生薑半分掐衉 右搖竅和九一 服一 後方治胸肠痞滿心寒氣急喘急 草荳蔻皮陳橘皮 炒三分 り三み 乾薑丸 一兩日夜五七九服不愈更服 人枚擘破同煎七分去滓温服 白木分一枳實一乾薑 枝若啜加瓜莲二雨吐加牡礪 卷一百三十九 ) 渴浸去白焙 甘草其人參分三 重积殷去粮处 胊

大江丁事人五十日 右哎咀水 坡家藏方 枳殼 而痛此是結骨如骨有水須用大黃甘逐草 攻胷膈多致不救凡胷膈病可渴膈若按之坚硬 粉十死七八此盖寫其下焦下焦虛則氣愈見上 則氣上腦胷世俗謂之結胷多更用巴豆粉霜脈 沩出 枳實桔梗各 Ġ 112 桔 一升半颜 梗积敬治傷寒痞氣胃滿欲死者出東 普濟方 半去浑分作二服傷寒下早 主

樂錄此湯行氣下膈耳無他損又西晉崔勛方得 史大夫以此湯飲之下黄水一升許遂差予得此 傷寒或下或不下心中結滿胃膈痞寒氣急厥逆 脹勿問結胃痞氣但先服此樂若不選然後别下 **痞氣上虛氣熱膨脹只可用黃芩大黃黃連之類** 化之當有患骨脹已危因作結問痞氣治皆不差 法用之如神若是痞氣莫不應手而消凢傷寒貿 陷胃汤之類是也若按之不甚硬亦不甚痛此名 第一百三十九 次定四車全書 加减理中九人書治寒實陷胃及傷寒諸吐利後胃痞 **欲絕賜髙起急痛手不得近** 復上攻氣毒相傳結於胷中氣毒相激故到此病 **欲絕心貿髙起手不得近二三日 軟死用瀉心大** 若療之當用加减理中九先理其氣次療諸疾 小陷貿湯皆不差當是下後虛逆氣已不理而毒 , 姚炒或灸二 甘草西一乾薑十 普湾ら 硒

右察九彈子大一九不效再服予時用此神速下喉 氣即相接續後與之不過五六彈丸胷中豁然矣 牡蠣二兩又妙此予屢武之效其功神速今以此 用樂之速未當見此渴者加瓜姜二兩下利者加 方廣傳又每有論述教人濟活存心仁矣 九與松實湯魚服無不驗所謂枳實只是枳殼古 人謂之枳實後人方別出枳實東坡先生既以秘 息長 治傷寒汗後腹脇脹滿食少嘔逆

欠己の同人的 附子湯與雖治傷寒因下後脾胃虚冷腹脇脹滿 石搖篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎棗三枚 提節為散每服五錢水一大盈入生薑半分 擘破同煎六分去滓食前温服 桂心谷半 灸令紫三分 去皮臍 兩地製赤茯苓 人的烙土 赤茯苓皮 普濟方 土夫黑 去粗 赤芍樂 **訶梨勒地去人** 香雨 了各平甘草 六十四 去蘆 Ò

金月世月八月雪日 茯苓湯出聖濟 · 搖篩為散每服三錢用水一盞入生薑半分拍 同煎半盛食前温服 枚煎五分去滓不計時候温服 出聖濟 卜去粗皮生姜汁 なま 桔梗 治傷寒後脾氣未順腹脇脹滿 治傷寒後中冷卒心腹脹滿不下食 雨冷透 人妙陳橘皮 卷一百三十九 三分 煨 坐] 芍薬 が乾谷 湯浸 去白 αÐ 炸 去粮 麩

次足り事を動 石為散每服三 腹皮 粗狼節每服三錢水 浑食前温服 煎半盞去滓食前温服 出些濟 出聖濟治傷寒後腹痛無两脇脹滿 1炒各 去租 计关 半 あ 皮生姜 錢水一盞生薑里 酌 .普濟方 當歸城木香 後心腹及腑 中盛入生薑半分拍砂 枳殻と雅 四京半盏去 玄 用 荻

金グセガノニー 枳殼湯出 粗据筛每服三錢水一盏入生薑平分拍碎同煎 粗狼節每服三錢水一盛煎至半盈去沒食前温 服 枳殼士粮处炒厚朴去租皮 分 總銀 茯苓去黑皮 去黑皮 滿治傷寒後心腹氣滞脹滿不能飲食 雨 木香 卷一百三十 桂玉粗 皮 生 白术 )到各

欠足引車とほう 飲食 石粗捣篩 每服三錢水一盏入生薑半分拍碎 不七物湯 出金治腹滿發熱十日脈浮而数飲食尚 厚朴去粗皮生 記一兩重 同煎取半盏去浑食前温服 湯浸去白焙 **盞去淳食前温服 木姜汁炙** 總跃 出聖濟治傷寒後氣未和心腹脹滿 ä 文则 普濟方 去黑皮各 两半 文

金ケモノノニー 附子粳米湯は金治腹中寒氣雷鳴切痛胃肠逆淌喔 吐者此方湯主之 右以水一斗煮取四升温服八合日三服嘔者加半 如敌者此渴主之 生薑 夏五合下利去大黄寒多者加生薑至半斤 厚朴中甘草 附子去皮解半夏片甘草一大麦枚粳米 五 卷一百三千九 亣

次足の事公とう! 盆中丹 厚朴三物湯质方治痛而閉者此湯主之 右以水一 右以水八升煮米熟湯成 石搖篩煉塞和九桐子大 髙良量 厚朴八大黄四枳實五十 八温分一升以利為度 治太陰病食則吐胃中 斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三 普濟方 **大白飲服三十九** 橘皮 **凭温服**一 痛腹脹時噫者 各四 一升日三服 六

金りロブイニュ 右粗搖筋每服三錢水一盞煎至半盞去滓 /軟虚也 服 兩 7 去 人出宣治傷力 **)**出理濟 總缺 去黑心黃連 **医病下後太早成痞滿而** 卷一百三十 妙土心根 皮 前温 黑

久已の最上日 益智散はか治傷寒陰後盛心腹痞滿嘔吐泄利手足 右為末每服三錢煎黃連湯下不計時候温服 石為散毎服三錢水二盞入生薑五片棗二枚擘敂 川鳥地黑皮 檳榔 同煎至八分去滓温服食前一方無生薑裹煎服 傷寒胸膈痰滞論 將四两盖智二两乾薑肉 切冷氣衝心脇臍腹脹絞痛 枳殻をき 告濟方 青皮 土去白 耐

成結疾也 胃虛不能宣行水穀津液閉塞不通水飲停于心胸而 金发电力人 少思飲食風熱相傳目眩頭痛上焦不利見食嘔此由 前胡散 天傷寒心胸壅滯痰飲留海不能消散故令心腹痞 胡去盧 方 出聖 恵が治傷寒刺胸膈痰滞壅頭目痛悶 去蘆頭 鲌 葪 旋復花 去渡 Ħ 卷一 有三十 r 赤线料半 处炒做 黄去猴 湯浸 去滑各 遍

大きりを大きから 复散 右㕮咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去 右㕮咀每服四錢水一中盞入生薑半兩煎至六分 皮癖 就畫地東十草兵既赤 去滓不計時候温服 雨 治傷寒頭痛壮熱痰壅心膈不利食久不消 過去所人參頭 赤茯苓 普濟方 一年雨 陳橘皮湯沒 澤寫的一附子 1

金ラロアノニ 杋 參散 飲妨悶 把葉散 右吹咀每服三錢水一中益入生薑半分煎至六分 芍樂 滓不計時候温服 去滓不計時候温服 治傷寒頭痛痰滞 頭 去虚 前胡去薦頭 治傷寒已解猶有風冷痰滯 赤茯苓 务 丏 ,就畫儿製 旋復花 百 壮熱心膈煩 ¥·] 細辛 )湯浸上過 悶 白芷 半 雨 夫

次定四事全事 魔頭 右為散每服三 模焙 六分去滓不計時候温服 **机把葉其去毛大香** 海去沿白术 二两去 浴吧逆肢體疼痛心胸不利 少士 澤湯 中盛入生薑半分 枳殼三分处炒陳橘片 去魔大腹皮到厚朴主非 附子 炮製去皮 臍各半两 羊

白木散 **昏沉胃氣不和少思飲食** 白ボ 過捣篩為散每服三錢水 分去淬不計時候温服 湯洗 湯洗上 去滑 治傷寒痰滞在胸腸間不散身體壮熱頭目 一村草及做赤 滑旋復花 甘菊花 炎微赤 各半 一巳上各 ъ́д 兩 卷一百三十九 剉 汾 剉 石膏 中盞入生薑半分煎六 前胡 皮癖 炮製去 土

欠足四事 旋復花散 右粗搖篩為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎 石捣筋為散每服三錢水一中盛入生薑半分養三 大狼桑根白皮 旋復花 六分去滓不計時温服 枚煎六分去滓不計時候温服 出聖濟治傷寒痰滞 THE STATE OF THE S 治傷寒頭痛心膈痰滞壅悶不欲飲食 前胡 人對赤茯苓 蝢 、去蘆 普濟方 白蒺藜其刺柴胡去枳是数 胸膈煩熱頭疼不思飲 上上各甘草做水到 ż

七氣九 金ラセスノニュ 屑 各半 湯浸上過 當歸 治病人 上各三分 去消甘草 (素有心下两脇結痛者此有久寒也 雨 時温服 苗 卷一百三十九 似赤 到秦根白皮 去日菜黄 桂 中盛入生事半分前 柴胡 前胡 乾薑 厚朴 人州犀角 土崖 颐 細

少定习事人 根白皮 光花光乾 起事各二两 提篩煉蜜和九梧桐子! 泊 **V.煉蜜和九如梧桐子大飲服三粒至五粒** 治少陽病肠下 杦 治病人傷中唾血脇下 紫死各一 两桔梗 .普消方 知母 下痛有停水者 熟地黄 入酒或飲下五粒 續斷 竹如 主 桑

橋皮湯出活治傷寒疾逆惡寒 柴胡半夏湯也語治痰熱頭疼利膈除煩問手足煩熱 まじて 無治五飲消痰癖 右用青季竹刮上青茹一團薑四片棗一枚水一 **榮衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜即少力飲食無味** 右水六升煮取三升去滓温服合日三 煎至六分去滓熟服 甘草以人家庭陳皮非 一百三十九

えんとりもという 右用枳實一 柴胡 劉如麻豆大母服炒五錢水一盛半 日二服 麥門冬去心各 枚煎ハ分去滓 一味剉麸炒黄為术服二錢米飲調下 開起痛出本 は温服 普濟方 丰

一方巻一百三十九 卷一百三十九